

## القمل عن معلومات

### Informationen zu Kopfläusen (arabisch)

كيفية علاج القمل	طرق انتقال القمل
<p>اليوم الأول بدء العلاج مباشرة عند اكتشاف القمل, باستخدام المواد العلاجية و التمشيط Nissenkamm الرطب بمشط</p> <p>اليوم الخامس : تمشيط الرطب لإزالة اليرقات و البيوض.</p> <p>اليوم الثامن, التاسع, العاشر: التمشيط مرة أخرى مع منظفات القمل لقتل يرقات وأواخر البيوض</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• زحف القمل من رأس المصاب إلى رأس الشخص الخالي من القمل، وذلك عن طريق الاتصال المباشر بين شعرهما، وهذه الحالة تحدث بنسبة كبيرة في المدارس ورياض الأطفال، لذلك أكبر فئة مصابة بالقمل هي فئة اطفال.</li><li>• استخدام فرشاة الشعر الخاصة بالمصاب.</li><li>• ينتقل قمل الجسم عن طريق الملابس.</li></ul>
الطبية المنتجات	فترة الحضانة
<p>-Biomopedicul 0,5% -Infectopedicul</p> <p>-Nyda -Jacutin Pedicul Fluid -Hedrin Once Liquid Gel</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• فالقمل يستطيع العيش لمدة لا بأس بها على الأدوات والملابس.</li></ul>
	الأعراض
	<ul style="list-style-type: none"><li>• وجود حكة شديدة في فروة الرأس.</li></ul>
	تكاثر القمل
	<ul style="list-style-type: none"><li>• يتكاثر القمل بالبيض، حيث تضع القملة بيوضها على جذور الشعر</li><li>• تبقى بيضة القملة ملتصقة بالشعر أسبوع، وتجدر الإشارة إلى أن البيضة تلتصق بالشعرة بواسطة مادة دهنية</li><li>• تكبر القملة بشكل سريع، حيث إنها تصبح قادرة على البيض وعمرها عشرة أيام فقط،، كما أنّ دورة حياة القملة لا تتجاوز</li></ul>

ووفقا للمادة 34 (1) من قانون حماية العدوى، لا يسمح للأشخاص المصابين الدخول إلى أي مرافق مجتمعية (رياض الأطفال، المدارس...) إلا بعد الحصول على تقرير طبي، لم يعد هناك أي خطر من زيادة الانتشار أو التنفيذ الصحيح للعلاج الأولي من جانب الوالدين. يمكن ان يكون التقرير الطبي في شكل مكتوب، وكذلك في شكل شخصي أو هاتفي. ومن حق المؤسسة المجتمعية أن تحتفظ بحق تقديم شكوى في أي حال!

وفقا للمادة 34 (6) فإن إدارة المرافق المجتمعية ملزمة بالإبلاغ عن إصابات القمل فوراً إلى السلطة الصحية وتقديم البيانات الشخصية. الآباء والأمهات على حد سواء مسؤولين عن تنفيذ تدابير العلاج، وكما يجب أيضاً تأكيد تنفيذ العلاج. ومن المهم بشكل خاص لأداء العلاج الثاني بعد 8-10 أيام!

#### التدابير الصحية

- يجب تنظيف الأمشاط، وفرشاة الشعر، ودبابيس الشعر في الماء الساخن والصابون.
- يجب تغيير أغطية الاسره و المناشف و البياضات على فترات أقصر.
- أغطية الرأس، والأوشحة، وغيرها، التي يمكن أن تكون قد انقلبت إليها العدوى يجب أن تبقى في أكياس بلاستيكية لمدة 3 أيام.
- في بعض الحالات، قد يكون من المفيد علاج الأشخاص الذين هم على اتصال (على سبيل المثال، أفراد العائلة المقربين) بشكل وقائي

